MCG（マルチファンクションカーディオグラム、心臓血管検査）を受けてみませんか？

がんに次いで死亡率が高いとされる心疾患を早期に発見し、予防していくことが重要です。この MCG 検査は安静心電図で心臓の筋肉のダメージの程度を評価します。

MCG 解析は、米国プレミアムハート社が約 30 年の年月をかけて解析した解析システムです。まず心電情報を取得します。その後インターネット回線を使用し、データを米国プレミアムハート社へ送信します。約 4 万人のデータベースと照合を行い、解析結果をスコア化し、レポートを作成します。

1) 四肢、胸部に電極をつけ約 20 分安静にし、心電情報を取得します。検査自体はこれで終了です。運動負荷することもなく、薬剤投与も行いません。放射線被爆の心配もありません。



2) インターネット回線を使用し、データを米国プレミアムハート社へ送信します。データベースと照合されます。

3) 解析結果をスコア化し、レポートを作成します。

■スコアの結果

総合判定	スコア	MCG スコアから見た重篤度	次回の測定
□A	0点以上 2点未満	**あなたのMCGスコアは正常範囲内です。** 定期的にMCGスコアを確認することにより、心臓病の早期検知/早期予防に努めてください。	1 年以内 の測定をお勧めします。
□B	2点以上 4点未満	**あなたのMCGスコアには若干の異常がみられます。** 医師、保健師の指導のもと動脈硬化予防に向けた、適切な運動/食事等の生活習慣の改善に努めてください。 定期的にMCGスコアを確認し、心臓病の早期検知/早期予防に努めてください。自覚症状や他の検査に注意して異常がある場合は循環器専門外来を勧めます。	6 か月以内 の測定をお勧めします
□C	4点以上 8点未満	**あなたのMCGスコアには異常がみられます。** 医師、保健師の指導のもと動脈硬化予防に向けた、適切な運動/食事等の生活習慣の改善に努めてください。 循環器専門医外来を受診し、追加の心臓専門検査を受ける事を勧めます。	6 か月以内 の測定をお勧めします。
□D	8点以上	**あなたのMCGスコアには大きな異常がみられます。** 虚血性心疾患　その他の心疾患の可能性があります。 自覚症状の有無に関わらず、治療の可能な循環器専門医外来の受診を強く勧めます。	3 か月以内 の測定をお勧めします。

胸痛などの胸部症状を有する方、糖尿病、脂質異常症、高血圧症などの動脈硬化の危険因子を有する方は一度 MCG 検査を受けることをお勧めします。

医療法人 JR 広島病院