

癌化学療法レジメン登録用紙

レジメン名 Her+nab-PTX
 対象疾患 胃癌 (HER2過剰発現)

催吐リスク 軽度

a) 投与薬剤名と投与量、投与方法

	薬剤名	量	投与方法
初回 day1	①	生食100mL+デカドロン6. 6mg	30分で点滴
	②	生食※+アブラキサン260mg/m ²	30分で点滴
	③	生食100mL	30分で点滴
	④	生食250mL+注射用水40mL◎+ハーセプチン8mg/kg	90分以上で点滴
	⑤	生食100mL	15分で点滴

※ アブラキサン1バイアルあたり20mlで懸濁。残りの生食はすべてボトルから抜き取り、必要量の懸濁液を空ボトルに注入し、点滴する。

2回目以降


day1	①	生食100mL+デカドロン6. 6mg	30分で点滴
	②	生食※+アブラキサン260mg/m ²	30分で点滴
	③	生食100mL	30分で点滴
	④	生食250mL+注射用水40mL◎+ハーセプチン6mg/kg	90分以上で点滴※※
	⑤	生食100mL	15分で点滴

※※ 初回の忍容性が良好なら、2回目以降は30分投与可。

- ◎ 60mgバイアル1Vあたり注射用水3. 0mLで溶解
- 150mgバイアル1Vあたり注射用水7. 2mLで溶解

b) 投与スケジュール

1コース21日



間隔が1週間以上空いた時には8mg/kgで再開(添付文書より)