

癌化学療法レジメン登録用紙

レジメン名
対象疾患

FP
食道癌

催吐リスク
高度

a) 投与薬剤名と投与量、投与方法

	薬剤名	量		投与方法
day1	①	生食50mL		ルート確保
	②	5%TZ250mL+5-FU700mg/m ²		24時間で点滴
	③	パノセトロンバッグ0.75mg/50mL+デカドロン9.9mg	側管	30分で点滴
	④	生食500mL+シスプラチン70mg/m ²	側管	120分で点滴
	⑤	ソルデム3A500mL	側管	120分で点滴
	⑥	ソルデム3A500mL	側管	120分で点滴
	⑦	ソルデム3A500mL	側管	120分で点滴
day2	①	5% TZ250mL+5-FU700mg/m ²		24時間で点滴
	②	ソルデム3A500mL	側管	120分で点滴
	③	ソルデム3A500mL	側管	120分で点滴
	④	ソルデム3A500mL	側管	120分で点滴
day3	①	5% TZ250mL+5-FU700mg/m ²		24時間で点滴
	②	ソルデム3A500mL	側管	120分で点滴
	③	ソルデム3A500mL	側管	120分で点滴
	④	ソルデム3A500mL	側管	120分で点滴
day4	①	5% TZ250mL+5-FU700mg/m ²		24時間で点滴
day5	①	5% TZ250mL+5-FU700mg/m ²		24時間で点滴
	②	生食100mL		15分で点滴

b) 投与スケジュール

1コース28日

