

癌化学療法レジメン登録用紙

レジメン名 Bev(2週毎)+内服
 対象疾患 大腸癌

平成30年4月2日 新規
 2020年11月5日 修正(14日毎→28日毎へ)

催吐リスク 中等度

a) 投与薬剤名と投与量、投与方法


	薬剤名	量	投与方法
day1,15	①	生食100mL+ベバシズマブBS 5mg/kg	90分で点滴※※
	②	生食100mL	15分で点滴

※※ 初回が良好なら2回目からは60分で投与可能。
 2回目が良好なら3回目以降からは30分で投与可能。

	ロンサーフ 1コース28日	内服
day1～day5 and day8～day12	BSA < 1.07m ²	70mg/day を分2で内服
	1.07 ≤ BSA < 1.23m ²	80mg/day を分2で内服
	1.23 ≤ BSA < 1.38m ²	90mg/day を分2で内服
	1.38 ≤ BSA < 1.53m ²	100mg/day を分2で内服
	1.53 ≤ BSA < 1.69m ²	110mg/day を分2で内服
	1.69 ≤ BSA < 1.84m ²	120mg/day を分2で内服
	1.84 ≤ BSA < 1.99m ²	130mg/day を分2で内服
	1.99 ≤ BSA < 2.15m ²	140mg/day を分2で内服
	2.15 ≤ BSA	150mg/day を分2で内服

b) 投与スケジュール

1コース28日



注)【S】Bev(2週毎)+内服の方で入力するとBev1回分のみ入力されるので要注意。