

癌化学療法レジメン登録用紙

レジメン名
対象疾患

Cmab+mFOLFOX6
大腸癌

催吐リスク
中等度

平成29年12月13日 変更
平成30年6月1日改訂 (持続注入ポンプ充填量150mL→140mL)
令和4年6月28日 2回目以降生食500→250mLに変更

a) 投与薬剤名と投与量、投与方法

	薬剤名	量	投与方法
day1	①	生食50mL(持続注入ポンプ使用時)	ルート確保用
	②	パロノセトロンバッグ0.75mg/50mL+デカドロン6.6mg+ポララミン5mg	30分で点滴
	③	生食500mL+アービタックス400mg/m ² (初回)	120分で点滴
	または	生食250mL+アービタックス250mg/m ² (二回目以降)	60分で点滴
	④	生食100mL	60分で点滴
	⑤-1	5%ブドウ糖250mL+エルプラット85mg/m ²	120分で点滴
	⑤-2	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート200mg/m ²	120分で点滴
	⑥	5%ブドウ糖50mL+5-FU400mg/m ²	15分で点滴
	⑦	生食500mL+5-FU2400mg/m ²	46時間で点滴
	もしくは	生食(total 140mLになるように)+5-FU2400mg/m ²	46時間で持続注入ポンプにて投与
	⑧	生食100mL(持続注入ポンプを使用しない時のみ)	15分で点滴
day8	①	生食100mL+デカドロン6.6mg+ポララミン5mg	30分で点滴
	②	生食250mL+アービタックス250mg/m ²	60分で点滴
	③	生食100mL	60分で点滴

b) 投与スケジュール

1コース14日

