

# 癌化学療法レジメン登録用紙

レジメン名  
対象疾患

Pmab+FOLFIRI  
大腸癌

催吐リスク  
中等度

平成30年6月1日改訂 (持続注入ポンプ充填量150mL→140mL)

## a) 投与薬剤名と投与量、投与方法

	薬剤名	量	投与方法
day1	①	生食50mL(持続注入ポンプ使用時)	ルート確保
	②	生食100mL+ベクティビックス6mg/kg	60分で点滴 ※
	③	パロノセトロンバッグ0.75mg/50mL+デカドロン6.6mg	30分で点滴
	④-1	5%ブドウ糖250mL+イリノテカン150mg/m <sup>2</sup>	120分で点滴
	④-2	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート200mg/m <sup>2</sup>	120分で点滴
	⑤	5%ブドウ糖50mL+5-FU400mg/m <sup>2</sup>	15分で点滴
	⑥	生食500mL+5-FU2400mg/m <sup>2</sup>	46時間で点滴
もしくは	⑦	生食(total 140mLになるように)mL+5-FU2400mg/m <sup>2</sup>	46時間で持続注入ポンプにて投与
	⑦	生食100mL(持続注入ポンプを使用しない時のみ)	全開

※ フィルター付きルートを使用

## b) 投与スケジュール

1コース14日

