

## 癌化学療法レジメン登録用紙

レジメン名	CDDP+PEM	
対象疾患	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	催吐リスク
診療科	呼吸器内科	高度

a) 投与薬剤名と投与量、投与方法

	薬剤名	量	投与方法
day1	①	生食50mL	ルート確保用
	②	生食1000mL	120分で点滴
	③	パロノセトロンバッグ0.75mg/50mL+デカドロン9.9mg	30分で点滴
	④	生食★+ペトレキセド500mg/m <sup>2</sup>	10分で点滴
	⑤	マンニトールS 300mL	40分で点滴
	⑥	生食500mL+シスプラチン75mg/m <sup>2</sup>	90分で点滴
	⑦	ソルデム3A 500mL	60分で点滴
	⑧	ソルデム3A 500mL+10%塩化ナトリウム1A+硫酸マグネシウム補正液8mEq	60分で点滴

★ Total100mLになるように生食を抜いた後にペトレキセド必要量を混注

day2, 3

	①	生食100mL+デカドロン6.6mg	30分で点滴
	②	ヴィーンF 500mL	120分で点滴
	③	ヴィーンF 500mL	120分で点滴
	④	ヴィーンF 500mL	120分で点滴

◎ イメンドCap 125mg(day1)、80mg(day2&3)内服

※ ペトレキセド投与一週間以上前から1日1回葉酸0.5mg/日を連日内服。  
以後、ペトレキセド最終投与日から22日目まで連日内服を続ける。

※※ ペトレキセド投与一週間以上前からVB<sub>12</sub>1mg/日を筋注。  
以後、9週ごとに投与し、ペトレキセド最終投与日から22日目まで続ける。

b) 投与スケジュール

1コース21日

