

癌化学療法レジメン登録用紙

レジメン名
対象疾患

MEA
Middle-High risk 絨毛性疾患
平成27年12月2日 変更

a) 投与薬剤名と投与量、投与方法

		薬剤名 量	投与方法
day1	①	グラニセトロンバッグ3mg/100mL+デカドロン6.6mg	15分で点滴
	②	生食100mL+メソトレキセート150mg/body	全開で投与
	③	生食500mL+メソトレキセート300mg/body	4時間で点滴
	④	生食20mL+コスメゲン0.5mg/body(蒸留水1.1mLで溶解)	側管から静注
	⑤	生食500mL+ベプシド100mg/body	120分で点滴
	⑥	生食100mL	15分で点滴
day2	①	グラニセトロンバッグ3mg/100mL+デカドロン6.6mg	15分で点滴
	②	生食20mL+コスメゲン0.5mg/body(蒸留水1.1mLで溶解)	側管から静注
	③	生食500mL+ベプシド100mg/body	120分で点滴
	④	生食100mL	15分で点滴
	⑤	ロイコボリン15mg/body	筋注(12時間毎)
	⑥	ロイコボリン15mg/body	筋注(12時間毎)
day3	①	グラニセトロンバッグ3mg/100mL+デカドロン6.6mg	15分で点滴
	②	生食20mL+コスメゲン0.5mg/body(蒸留水1.1mLで溶解)	側管から静注
	③	生食500mL+ベプシド100mg/body	120分で点滴
	④	生食100mL	15分で点滴
	⑤	ロイコボリン15mg/body	筋注(12時間毎)
day4	①	グラニセトロンバッグ3mg/100mL+デカドロン6.6mg	15分で点滴
	②	生食20mL+コスメゲン0.5mg/body(蒸留水1.1mLで溶解)	側管から静注
	③	生食500mL+ベプシド100mg/body	120分で点滴
	④	生食100mL	15分で点滴
day5	①	グラニセトロンバッグ3mg/100mL+デカドロン6.6mg	15分で点滴
	②	生食20mL+コスメゲン0.5mg/body(蒸留水1.1mLで溶解)	側管から静注
	③	生食500mL+ベプシド100mg/body	120分で点滴
	④	生食100mL	15分で点滴

b) 投与スケジュール

1コース21日

